


ÉVALUATION DE LA DOULEUR - MESURER LA DOULEUR CHEZ LES PATIENTS ADULTES CONSCIENTS EN UTILISANT L'ÉCHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA)

L'échelle analogique visuelle (EVA) est un instrument de mesure unidimensionnel utilisé à large échelle pour diverses populations adultes en vue d'évaluer l'intensité de la douleur [5].

		Concept	C	E	P
PRÉPARATION					
1	Examinez la feuille d'observation médicale du patient: <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la situation des résultats antérieurs du screening Vérifiez si des médicaments contre la douleur ont été prescrits antérieurement 				0 1 3
2	Désinfectez vos mains ou mettez des gants de protection à usage unique (<i>seulement dans le cas de certaines lésions des mains de l'infirmière ou d'un potentiel infectieux important du patient</i>), comme précaution standard.	<i>Précautions standard</i>			0 1 3
3	<i>Fermez la porte et assurez un espace privé pour mesurer la douleur, s'il en est le cas. (les rideaux, le paravent, mettre une présence etc.)</i>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 1 3
4	Evaluation rapide de la présence des signes vitaux (<i>état de conscience, capacité locomotrice, le parler, la respiration</i>) Bonjour. Je m'appelle.... Je suis l'infirmière qui va mesurer le niveau de votre douleur	Fonctions vitales conservées <input type="checkbox"/> ; arrêt cardiorespiratoire <input type="checkbox"/> (<i>initiation des mesures médicales - ressuscitation, - initiation de la discussion</i>)			0 2 5

5	Dites-moi votre nom, s'il vous plaît ... Et votre date de naissance... Je vous remercie.	<i>La conformité avec la feuille d'observation médicale pour:</i> Nom: <input type="checkbox"/> Date de naissance: <input type="checkbox"/>	ESSENTIEL		
6	Relevez le lit en position de travail (à une hauteur convenable) et éventuellement descendez ses parties latérales.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 1 3
MESURER LA DOULEUR					
8	Présentez l'échelle EVA	On explique au patient CE QU'ON VA FAIRE Dites au patient CE QU'IL DOIT FAIRE	ESSENTIEL		
					
9	Demandez au patient de marquer sur l'échelle EVA comment il ressent la douleur actuellement.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 1 3
10	S'il en est le cas, remettez le lit et ses parties latérales dans la position initiale.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 1 3
SUIVI ULTÉRIEUR					
11	Vérifiez si la sonnette (ou un autre appareil pour appeler) est à disposition.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 1 3
12	Eteignez la présence.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 2 5
14	Mesurez le score sur l'EVA en utilisant une règle, en conformité avec l'usage local, en cm ou en mm, et inscrivez le score de la douleur dans la feuille d'observation médicale du patient.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 4 9
15	Si le screening est réalisé pour la première fois et il indique une douleur faible (5-44 mm), modérée (45- 74mm) ou intense et très intense (75-100mm) informez tout de suite le médecin traitant et demandez-lui de prescrire des médicaments contre la douleur.	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			0 2 5

